

FICHA TÉCNICA

DIMENSIONES:

Ancho: 14 cm
Alto: 15,6 cm
Dobleses: 3
Caras: 2 de 3,8 cm y 2 de 4 cm
Frente y Dorso
Escala: 1-1

Papel: Obra
Gramaje: 57
Color: negro

COLORES:

- Troquel, no imprime
- Líneas de doblez, no imprime
- Negro 100%

ORIGINAL

<div style="text-align: center;"> <p>14 cm</p> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">Flexiplen 25</h1> <h2 style="margin: 0;">Diclofenac Sódico 25mg</h2> </div>	<p>14 cm</p>
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: 0.8em; font-weight: bold;">104815</div> </div> <p>Venta libre Industria Argentina</p> <p>LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO</p> <p>¿Qué contiene FLEXIPLLEN 25? FLEXIPLLEN 25 tiene 25 miligramos de diclofenac sódico por cada cápsula blanda. Otros componentes de la cápsula blanda: polietilenglicol 600; gelatina; glicerina bi-distilada; sorbitol polyol; metilparabeno; propilparabeno; agua purificada USP c.s..</p> <p>Acciones Analgésico y Antiinflamatorio. Calma el dolor muscular y articular y los dolores menstruales.</p> <p>¿Para qué se usa FLEXIPLLEN 25?: FLEXIPLLEN 25 es usado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, dolores en las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.</p> <p>¿Qué personas NO pueden recibir FLEXIPLLEN 25? No use este medicamento si usted sabe que es alérgico al Diclofenac o alguno de los ingredientes de la fórmula. No use este medicamento si usted está embarazada o dando pecho a su bebé.</p> <p>¿Qué cuidados debo tener antes de tomar FLEXIPLLEN 25? Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias, enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón, hemorragias, alteradores de la coagulación o tratamiento anticoagulante, tratamiento intensivo o diurético, insuficiencia hepática, renal, consulte a su médico antes de tomarlo.</p>	<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">3,8 cm</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4 cm</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">4 cm</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">3,8 cm</p>
<p>Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.</p> <p>Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.</p> <p>¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando FLEXIPLLEN 25? Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como molestias gastrointestinales (náuseas/vómitos, diarrea/constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción en la piel, picazón, urticaria, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.</p> <p>Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo Hipertensión arterial, Diabetes, Hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.</p> <p>SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO.</p> <p>NO ADMINISTRAR POR MÁS DE 5 DÍAS PARA EL DOLOR O 3 DÍAS PARA LA FIEBRE.</p> <p>¿Cómo se usa FLEXIPLLEN 25? Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula 3 veces por día (cada 8 horas). Dolores menstruales: 1 cápsula 1 o 2 veces por día. Ingerir preferentemente el producto después de las</p>	<p>comidas. Vía de administración: ORAL Dosis máxima: 75 mg/día (3 cápsulas de 25 mg).</p> <p>Mayores de 65 años: consulte con su médico. Niños menores de 15 años: consulte con su médico.</p> <p>- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal. - No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico. - No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.</p> <p>¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria? Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:</p> <p>Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247 Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654 6648 Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA) Tel.: (011) 4961 8447</p> <p>¿Tiene usted alguna pregunta? Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS SAVANT PHARM S.A. al teléfono 0810-444-32267. También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">“Ante cualquier duda consulte a su médico”</p> <p>MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.</p>
<p>Presentación: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 40, 60 y 90 cápsulas de gelatina blanda, siendo las 3 últimas presentaciones de Uso Hospitalario Exclusivo.</p> <p>1004815 Emisión: 08/16 Revisión: 09/15</p>	<p>Elaborado en SAVANT PHARM S.A. Complejo Industrial RN N° 19, Km 204 Córdoba, CP: X2432XAB Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 54155 Elaborado en Argentina</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">0810-444-32267 www.savant.com.ar</p>

15,6 cm