

Tostop

Bromhexina 160 mg/100 ml
Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.



**mucolítico y
expectorante**

DE LAS SECRECIONES BRONQUIALES
SOLUCIÓN ORAL

120 ml
VENTA LIBRE

SAVANT

Tostop

Bromhexina 160 mg/100 ml
Alivia el catarro bronquial y la tos con flema.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN
ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

• ¿Qué contiene TOSTOP?

TOSTOP tiene 160 miligramos de bromhexina clorhidrato cada 100 mililitros de solución oral. Otros componentes de la solución oral: Cremophor RH 40; Alcohol etílico 96%; Glicerina; Sacarina sódica; Benzoato de sodio; Hidroxietilcelulosa; Sorbitol solución 70%; Ácido tartárico; Miel natural de abejas; Colorante tartrazina C.I. 19.140; Colorante indigo carmin C.I. 73.015; Colorante rojo allura C.I. 16.035; Aroma de miel; Agua purificada c.s.p 100 ml.
Contenido alcohólico: 4,92 % P/V

• Acciones

Mucolítico y expectorante de las secreciones bronquiales.

• ¿Para qué se usa TOSTOP?

TOSTOP es usado para el alivio del catarro bronquial y la tos con flema, facilitando su expectoración.

• ¿Qué personas NO pueden recibir TOSTOP?

No use este medicamento si usted sabe que es alérgico a la bromhexina o a alguno de los ingredientes de la fórmula.

No utilizar en personas con dificultad para expectorar, que padezcan enfermedad del hígado o riñón o pacientes con asma.

No debe utilizarlo si usted está bajo tratamiento con disulfiram o padece úlcera péptica activa. Por su contenido de alcohol etílico, no se aconseja su uso a niños menores de 6 años.

• ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar TOSTOP?

Este medicamento debe ser utilizado con precaución en pacientes con úlcera gastrointestinal.

Si usted recibe otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, si sufre de diabetes o es intolerante a ciertos azúcares consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Dado que durante el tratamiento es de esperar un aumento de la secreción, puede ser indeseable en pacientes incapaces de expectorar.

Este medicamento contiene tartrazina como colorante.

Este medicamento contiene alcohol.

• ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando TOSTOP?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, raramente pueden aparecer molestias gastrointestinales (náuseas, ardor) o reacciones alérgicas, como por ejemplo erupción de la piel, edema en la cara, dificultad para respirar, aumento de la temperatura y escalofríos.

No debe ingerirse este medicamento si usted está tomando al mismo tiempo productos antitusígenos.

SI EN 48 HORAS LOS SÍNTOMAS EMPEORAN O NO MEJORAN CONSULTE INMEDIATAMENTE CON SU MÉDICO.

NO ADMINISTRAR ESTE PRODUCTO POR MÁS DE 5 DÍAS.

● **¿Cómo se usa TOSTOP?**

Adultos y niños mayores de 12 años: 10 ml (1 cucharada de sopa) 3 veces por día (cada 8 horas). Por su contenido de alcohol etílico, no se aconseja su uso a niños menores de 6 años.

● **¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:
Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962 6666 / 2247
Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas - Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447

● **¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.
También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204
Córdoba – CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto
Farmacéutico.
E.M.A.M.S. Certificado N° 52112
Elaborado en Argentina

1003684

Emisión: 03/14

Revisión: 03/13

Presentación: 1 frasco por 120 ml.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de Conservación:

Conservar en su envase original a temperatura ambiente entre 15° C y 30° C, bien cerrado y al abrigo de la luz.

0810-444-32267

➔ www.savant.com.ar


SAVANT