

NUEVAPINA 100

Aspirina

Comprimidos 100 mg

Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿Qué contiene NUEVAPINA 100?

NUEVAPINA 100 contiene 100 miligramos de aspirina DC 90 por cada comprimido.

Otros componentes de los comprimidos: celulosa microcristalina; almidón glicolato de sodio; sacarina sódica; laca aluminica eritrosina; esencia de frutilla polvo; esencia de vainilla polvo.

Composición de DC90: Ácido Acetil Salicílico; Ácido Tartárico; Talco; Almidón; Etilcelulosa; Hidroxipropilmetilcelulosa.

Acción:

Analgésico. Antifebril. Antiinflamatorio. Antiagregante plaquetario.

¿Para qué se usa NUEVAPINA 100?

NUEVAPINA 100 se utiliza en adultos para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovasculares como: colesterol o triglicéridos elevados, diabetes, tabaquismo, hipertensión arterial, que hayan padecido una afección cardiaca, tal como infarto o angina de pecho (dolor en el pecho de causa cardiaca). En niños está indicado para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados tales como dolores de cabeza y dentición, y para bajar la fiebre.

¿Qué personas NO pueden recibir NUEVAPINA 100?

No usar este medicamento en caso de alergia conocida al ácido acetilsalicílico u otros salicilatos, en presencia de trastornos hemorrágicos, en presencia de úlceras gástricas o duodenales, problemas del hígado o riñones, trastornos hemorrágicos o de la coagulación.

Este medicamento no debe administrarse a menores de 2 años sin consultar al médico, ni en menores de 15 años con síntomas de gripe o varicela, ya que puede incrementar el riesgo de desarrollar Síndrome de Reyé, el Síndrome de Reyé es una enfermedad rara, que puede ser mortal, por esta razón no debe administrarse este

medicamento a menores de 16 años a menos que sea indicado por un médico.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar NUEVAPINA 100?

Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece asma, diabetes, hipertensión arterial no controlada, gota hemofilia u otros problemas de coagulación sanguínea, consulte a su médico.

Las personas mayores de 65 años no deben tomar este medicamento sin consultar al médico, ya que son más propensos a padecer efectos adversos.

No debe ser tomado con anticoagulantes, hipoglucemiantes orales (medicación para la diabetes), diuréticos, antianginosas (medicación para el corazón), corticoides. Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico antes de tomar este producto a fin de evaluar posibles interacciones entre los mismos.

Si usted toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consultar con su médico.

Este medicamento contiene eritrosina como colorante.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando NUEVAPINA 100?

Pueden aparecer efectos adversos no deseados causados por el medicamento, reacciones de hipersensibilidad (erupción, picazón, urticaria), náuseas, vómitos, irritación gástrica con o sin pérdida de sangre por materia fecal, alteraciones sanguíneas.

Si usted ingiere regularmente otro medicamento consulte a su médico.

¿Cómo se usa NUEVAPINA 100?

Adultos: como antiagregante plaquetario, 1 comprimido por día. Este medicamento no debe utilizarse por más de 2 ó 3 meses sin control médico.

Niños: 50 mg/kg/día.

Edad (años)	Peso (Kg)	Dosis
2 a 4 años	14 a 16	2 comprimidos 3 veces por día
4 a 6 años	17 a 20	3 comprimidos 3 veces por día
6 a 9 años	21 a 29	4 comprimidos 3 veces por día
9 a 12 años	30 a 38	5 comprimidos 3 veces por día

No debe utilizarse en niños menores de 2 años

Esta presentación se administra por vía oral.

Tomar los comprimidos con suficiente cantidad de agua, de preferencia después de las comidas o con algún alimento.

Si los síntomas no mejoran en 48 horas, aparecen nuevos o empeoran suspenda su medicación y consulte con su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas Tel.: (011) 4654 6648

**Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA)
Tel.: (011) 4961 8447**

¿Tiene usted alguna pregunta?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Forma de conservación:

Conservar a una temperatura entre 15° C y 30° C.

Presentación:

Envases conteniendo 100 comprimidos.

1005463

Emisión: 04/17

Revisión: 02/14

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204
Córdoba, CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto,
Farmacéutico
E.M.A.M.S. Certificado N° 51201
Elaborado en Argentina

☎ 0810 · 444 · 32267
🌐 www.savant.com.ar

 SAVANT