

# Gripaben

## CARAMELOS

• GRAMICIDINA 0,25mg. • NEOMICINA 2,5mg. • BENZOCAÍNA 10 mg.

Industria Argentina

**Venta libre**

### LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

#### ¿Qué contiene GRIPABEN Caramelos?

GRIPABEN Caramelos contiene 0,25 mg de gramicidina; 2,5 mg de neomicina (como sulfato) y 10 mg de benzocaína (aminobenzoato de etilo) por cada caramelo.

Otros componentes de los caramelos: glucosa; azúcar; tartrazina; esencia de limón.

#### Acciones:

Antiséptico bucofaringeo con acción anestésica.

#### ¿Para qué se usa Gripaben Caramelos?

GRIPABEN Caramelos es usado para el alivio temporario del dolor de garganta y la inflamación de boca y garganta.

#### ¿Qué personas NO pueden recibir GRIPABEN Caramelos?

No use este medicamento si usted sabe que padece alergia a la gramicidina, neomicina, benzocaína o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

#### ¿Qué cuidados debo tener antes de tomar GRIPABEN Caramelos?

Si usted presenta intolerancia a cierta clase de antibiótico (aminoglucósidos o polipeptídicos) consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**ESTE MEDICAMENTO CONTIENE TARTRAZINA COMO COLORANTE QUE PUEDE PRODUCIR REACCIONES ALÉRGICAS GRAVES.**

#### ¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando GRIPABEN Caramelos?

Consulte a su médico si:

- Durante el tratamiento con GRIPABEN Caramelos presenta alergia de piel.
- Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, hinchazón, enrojecimiento o dificultad para respirar.
- Si usted está tomando algún medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé.

No utilizar en caso de lesiones muy extensas en la boca y/o garganta.

No utilizar más cantidad ni con más frecuencia que la indicada.

Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca, por lo cual se recomienda dejar pasar una hora para evitar mordeduras, atragantarse con alimentos, etc.

No utilizar simultáneamente con otros antisépticos o desinfectantes bucales.

SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MAS DE 48 HORAS DE TRATAMIENTO, NO MEJORAN O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO.

ESTE MEDICAMENTO NO ES UNA GOLOSINA.

#### ¿Cómo se usa GRIPABEN Caramelos?

Adultos y niños mayores de 12 años: dejar disolver lentamente en la boca 1 caramelo sin masticar cada 3 ó 4 horas. No exceder los 4 caramelos por día.

#### ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tomé más cantidad de la necesaria?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica:

**Unidad Toxicológica del Hospital de Niños  
Dr. Ricardo Gutiérrez  
Tel.: (011) 4962 6666 / 2247  
Centro Nacional de Intoxicaciones  
Policlínico Prof. A. Posadas  
Tel.: (011) 4654 6648  
Centro Toxicológico de la Facultad  
de Medicina (UBA)  
Tel.: (011) 4961 8447**

**¿Tiene usted alguna pregunta?**

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con SAVANT al teléfono 0810-444-32267.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS  
ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O  
FARMACÉUTICO.**

**Forma de Conservación:**

Mantener a una temperatura entre 15° C y 30° C, lejos de la luz directa y el calor.

**Presentación:**

Envases conteniendo 9 caramelos.

1005513

Emisión: 05/17

Revisión: 11/13

Elaborado en SAVANT PHARM S.A.  
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204  
Córdoba, CP: X2432XAB  
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto,  
Farmacéutico  
E.M.A.M.S. Certificado N° 54286  
Elaborado en Argentina

➔ **0810 · 444 · 32267**  
➔ **www.savant.com.ar**

**SAVANT**