

FIEBROLEX

Paracetamol

Solución 2%

Vía de administración oral

Venta libre

Fórmula:

Cada 100 ml de solución contiene:

Paracetamol..... 2 g
Excipientes: Glicerina destilada 10 g; Aspartame 0,10 g; Acesulfame potásico 0,045 g; Colorante rojo allura C.I. 16035 0,010 g; Alcohol etílico 96% 8,129 g; Povidona 1 g; Esencia de frutilla líquida 0,1 ml; Metilparabeno sódico 0,137 g; Propilparabeno sódico 0,023 g; Ácido clorhídrico c.s.p. pH 5 – 7; Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Contenido alcohólico: 8,129% P/V

Acción terapéutica:

Analgésico. Antifebril.

Indicaciones:

FIEBROLEX está indicado para estados febriles y dolores leves a moderados en niños.

Posología y forma de administración:

Las dosis indicadas a continuación pueden repetirse de 3 a 4 veces por día.

| EDAD | SOLUCIÓN |
|------------------------------------|---|
| | 1 cucharadita de té: 5 ml: 100 mg |
| Adultos y niños mayores de 12 años | 5  25 ml: 5 cucharaditas de té |

La dosis de paracetamol es de 50 mg/Kg/día.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad conocida al paracetamol (aumento del riesgo de reacción alérgica).

Enfermedades hepáticas o hepatitis viral, trastornos funcionales, renales o alcoholismo.

Antecedentes de úlcera recurrente. Úlcera péptica activa.

Precauciones y advertencias:

No usar si el envase esta abierto o dañado.

Cuando el dolor dura más de 5 días o cuando la fiebre persiste más de 3 días, consultar a su médico.

Se han detectado reacciones moderadas de espasmo bronquial con el uso de paracetamol en algunos pacientes sensibles a la aspirina.

Si Ud. está tomando algún medicamento o está embarazada o amamantando consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si Ud. toma 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte al médico antes de tomar analgésicos.

Interacciones:

La asociación con otros antiinflamatorios no esteroides puede potenciar los efectos terapéuticos y eventualmente los efectos tóxicos.

El uso de paracetamol puede interactuar con otros medicamentos tales como anticonvulsivantes (fenobarbital, difenilhidantoina, carbamecepina), por lo que de estar consumiendo alguno de estos medicamentos realice una previa consulta a su médico.

Reacciones adversas:

Erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre.

Sobredosificación:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez - Tel.: (011) 4962 6666 / 2247

**Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A.
Posadas - Tel.: (011) 4654 6648
Centro Toxicológico de la Facultad de Medicina (UBA) -
Tel.: (011) 4961 8447**

Conservación:

Mantener a una temperatura entre 15 °C y 30 °C,
lejos de la luz directa.

Presentación:

Envase conteniendo 1 frasco por 120 ml.

**MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O
FARMACÉUTICO.**

1007187

Emisión: 04/20

Revisión: 07/08

SAVANT PHARM S.A.
Complejo Industrial RN N° 19, Km 204
Córdoba, CP: X2432XAB
Director Técnico: Cristián Dal Poggetto, Farmacéutico
E.M.A.M.S. Certificado N° 48.123
Elaborado en Argentina

☎ 0810 - 444 - 32267

🌐 www.savant.com.ar